

математика в школі



7-8'2010

ІНДЕКС 74326

ДО НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:
НОВИЙ ПІДРУЧНИК
з ГЕОМЕТРІЇ для 10 класу
Авторів М. І. Бурди, Н. А. Тарасенкової

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА. ТРАПЕЦІЯ
(розробки уроків)

ДЖОН ТЕЙТ –
ЛАУРЕАТ АБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
2010 р.

Математика в школі

№ 7–8 (106–107) 2010 ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ

Передплатний індекс 74326

— НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ —

Щомісячник. Заснований у 1997 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 9136 від 08.09.2004 р.

ЗАСНОВНИКИ:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Схвалено вченого радою Інституту педагогіки НАПН України
(протокол від 24.06.2010 р. № 6)

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Головний редактор

Тамара Миколаївна ХМАРА, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут педагогіки НАПН України), Київ

Заступник головного редактора

Валентина Григорівна БЕВЗ, доктор педагогічних наук, доцент (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), Київ

Михайло Іванович БУРДА, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор (Президія НАПН України), Київ

Григорій Петрович БЕВЗ, кандидат педагогічних наук, доцент, Київ

Ніна Опанасівна ВІРЧЕНКО, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний технічний університет України «КПІ»), Київ

Миррослав Іванович ЖАЛДАК, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, професор (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), Київ

Микола Якович ІГНАТЕНКО, доктор педагогічних наук, професор (Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»), Ялта

Юрій Іванович МАЛЬОВАНИЙ, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, старший науковий співробітник (Президія НАПН України), Київ

Микола Олексійович ПЕРЕСТЮК, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, професор (Національний університет ім. Тараса Шевченка), Київ

Микола Вікторович ПРАЦЬОВИТИЙ, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), Київ

Наталія Сергіївна ПРОКОПЕНКО, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України, Київ

Олена Іванівна СКАФА, доктор педагогічних наук, професор (Донецький національний університет), Донецьк

Ніна Анатоліївна ТАРАСЕНКОВА, доктор педагогічних наук, професор (Черкаський національний університет), Черкаси

Василь Олександрович ШВЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), Київ

Микола Іванович ШКІЛЬ, доктор фізико-математичних наук, дійсний член АПН України, професор (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), Київ

Василь Васильович ЯСІНСЬКИЙ, кандидат фізико-математичних наук, професор (Національний технічний університет України «КПІ»), Київ

ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДК № 123 від 17.07.2000 р.

Директор видавництва

Юрій КУЗНЕЦОВ, тел. 234-41-87

Заступник директора з виробництва

Валентина МАКСИМОВСЬКА, тел. 246-71-45

Головний художник

Володимир ЛІТВІНЕНКО, тел. 246-70-83

Завідувач відділу реалізації, збуту та реклами

Роман КОСТЕНКО, тел. 235-50-53

Адреса видавництва та редакції:

01004, Київ-4, вул. Басейна, 1/2

E-mail: admin@ped-pressa.kiev.ua

www.osvita-ukraine.com.ua

журнал «Математика в школі», тел. 234-23-20

Над номером працювали:

Олена ПОПОВИЧ (старший науковий редактор, відповідальна за випуск)

Володимир ЛІТВІНЕНКО (художник-дизайнер)

Марина КОЛМАГОРОВА (комп'ютерний набір)

Ірина КОСОНОЦЬКА (коректор)

За достовірність фактів, дат, назв тощо відповідають автори. Редакція не заважає поділяти їхні погляди. Листування ведеться на сторінках журналу. Рукописи не повертаються. У разі використання матеріалів посилання на журнал є обов'язковим.


© «Педагогічна преса», 2010

Усі права захищені. Жодна частина, елемент, ідея, композиційний підхід цього видання не можуть бути копійованими чи відтвореними у будь-якій формі і будь-якими засобами — як електронними, так і фотомеханічними, зокрема через ксерокопіювання, запис чи комп'ютерне архівування — без письмового дозволу видавця.

© «Математика в школі», 2010

ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНИХ НОМЕРАХ:

- Психолого-педагогічні особливості навчання методу математичного моделювання**
- Задачі на рух**
- Просторове мислення на уроках геометрії**



Наталія МУРАНОВА

Підготовка абитурієнтів з математики до вступу у вищі навчальні заклади

Сьогодні в Україні велику увагу приділяють якісній освіті в усіх її ланках, починаючи від дошкільної і закінчуючи післядипломною. Науково-педагогічний склад Інституту доуніверситетської підготовки (ІДП) Національного авіаційного університету (НАУ) з дня його створення працює над складанням навчальних планів і програм, а також навчально-методичного забезпечення для слухачів підготовчих курсів, удосконалюючи їх згідно з вимогами УЦОЯО до зовнішнього незалежного оцінювання. Щороку ми навчаємо близько 2,5 тис. абитурієнтів, які потім стають студентами НАУ та інших ВНЗ України. Тому вважаючи за потрібне поділитися нашими дробками.

За короткий час викладач курсів має дати учням певну кількість знань, умінь та практичних навичок, які необхідні йому для вступу до вищого навчального закладу та навчання за кредитно-модульною системою. Саме тому викладачі шукають нові методи і засоби навчання для інтенсивної підготовки абитурієнтів.

Останніми роками в педагогіці часто використовують бінарні методи навчання, що об'єднують діяльність викладача (навчати) та учня (учіння).

Звичайно, викладач не байдужий до того, що мають робити слухачі підготовчих курсів. Методи учіння необхідно обговорювати з учнями, а також контролювати їх використання.

Широко відомі методи навчання математики, розроблені методистами з України С. Шохор-Троцьким (метод доцільних задач) і К. Лебединцевим (абстрактно-дедуктивний і конкретно-індуктивний методи) [1]. Ми знаємо, що застосування методів навчання математики у старших і

середніх класах відрізняються. Саме тому викладачі застосовують такі основні методи навчання математики для абитурієнтів, які запропоновано вченим Г. Бевзом (див. мал. 1). Це не класифікація, а структура системи найважливіших методів, від застосування яких залежить якість навчання.

Проскриптивний метод навчання (*pro* — для, *scripta* — написане) передбачає супроводжувати пояснення докладними записами.

Наприклад, якщо викладач, пояснюючи учням теорему, записує «Дано — Довести — Доведення» він дотримується проскриптивного методу.

Інскриптивний метод навчання (*in* — без), якщо вчитель не записує довгих доведень теорем, а робить це усно, користуючись тільки малюнками, схемами тощо.


Використання цих методів залежить від того, який матеріал вивчається, за яких умов і наскільки вміло викладач їх використовує.

На основі узагальнення та систематизації багаторічного досвіду з методики навчання розв'язування задач у 2009 році видано навчальний посібник «Алгебра. Збірник тестових задач для вступників до вищих навчальних закладів» (Муранова Н. П. та ін.), якому надано гриф Міністерства освіти і науки України, він відповідає програмі з математики для слухачів підготовчих курсів ІДП НАУ. Видання може бути використано у системі доуніверситетської підготовки, в загальноосвітніх навчальних закладах, у школах (класах) з поглибленим вивченням математики, в ліцеях та гімназіях природничо-математичного профілю для підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та майбутніми вчителями-студентами фізико-математичних факультетів. Навчальний посібник містить задачі з математики, переважна більшість яких пропонувалася в різні роки на вступних іспитах з математики до НАУ та інших провідних вищих навчальних закладів України.

У посібнику наведено основні теоретичні відомості з розділів «Алгебра» та «Початки аналізу» (1 розділ). А саме: *арифметика* (натуральні і цілі числа; раціональні, ірраціональні, дійсні числа; алгебраїчні дії над числами; відсотки; пропорції); *алгебра* (степінь з натуральним показником; корінь n -го степеня; узагальнення степеня; формулі скороченого множення; подільність многочленів; розкладання многочлена на множники; прогресії; лінійні рівняння з однією змінною; системи лінійних рівнянь; рівняння другого степеня; ірраціональні рівняння; основні елементарні



Мал. 1. Основні методи навчання математики



ВСТУПНІ ІСПИТИ

функції, їхні властивості і графіки; нерівності); **тригонометрія; трансцендентні рівняння і нерівності; елементи математичного аналізу.**

У другому розділі представлено задачі з розділів «Алгебра» та «Початки аналізу». Кожний розділ складається із параграфів, що містять задачі трьох рівнів складності: **обов'язкового** (мінімального), **підвищованого** та **поглибленого**. Складність завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, що повинен виконати учень у процесі їх розв'язування.

Обов'язковий рівень містить задачі і вправи, подані у формі тестів, в основному репродуктивного характеру, на 2—3 логічні кроки. Для їх розв'язування учням достатньо знати основні алгоритми, визначення, формули, теореми й ознаки, передбачені навчальними програмами, (які можна знайти у 1-му розділі), а також вміти виконувати найпростіші тотожні перетворення, спрощення та обчислення.

Наведено приклади з розділу «Алгебра і початки аналізу».

1. Завдання обов'язкового рівня

1. Які з даних чисел раціональні:

a) $a = \sqrt{1,8}$, $b = e$, $c = \sqrt{1,96}$;

b) $a = \sqrt{1,9}$, $b = p$, $c = \sqrt{2,25}$?

2. Яким числом є значення виразу:

a) $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}}$;

А) раціональним; Б) ірраціональним;
В) інша відповідь.

b) $\log_3 \frac{1}{\sqrt{27}}$?

А) раціональним; Б) ірраціональним;
В) інша відповідь.

3. Яким числом є значення виразу:

a) $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$;

А) раціональним; Б) ірраціональним;
В) інша відповідь.

b) $\sqrt{3 - \sqrt{5}}$?

А) раціональним; Б) ірраціональним;
В) інша відповідь.

Спростити вираз:

4. a) $10\sqrt{3\frac{1}{5}} - \sqrt{125}$;

А) $2\sqrt{5}$; Б) $3\sqrt{5}$; В) інша відповідь;

b) $12\sqrt{1\frac{1}{3}} - \sqrt{27}$;

А) $-5\sqrt{3}$; Б) $5\sqrt{3}$; В) інша відповідь.

5. a) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$;

А) $\sqrt{6}$; Б) $\sqrt{3}$; В) 3; Г) інша відповідь;

б) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$;

А) 6; Б) $-\sqrt{7}$; В) $\sqrt{5}$; Г) інша відповідь.

6. a) $\sqrt{(5 - \sqrt{5})^2} + \sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2}$;

А) 3; Б) $\sqrt{5}$; В) $8 - 2\sqrt{5}$; Г) інша відповідь;

б) $\sqrt{(\sqrt{7} - 3)^2} + \sqrt{(5 - \sqrt{7})^2}$;

А) $\sqrt{7}$; Б) $8 - 2\sqrt{7}$; В) 3; Г) інша відповідь.

48. Обчислити:

a) $(\sin 160^\circ + \sin 40^\circ)(\sin 140^\circ + \sin 20^\circ) + (\sin 50^\circ - \sin 70^\circ)(\sin 130^\circ - \sin 110^\circ)$;

А) -1; Б) 0; В) 1; Г) інша відповідь;

б) $(\cos 70^\circ + \cos 50^\circ)(\cos 310^\circ + \cos 290^\circ) + (\cos 40^\circ + \cos 160^\circ)(\cos 320^\circ - \cos 380^\circ)$;

А) -1; Б) 0; В) 1; Г) інша відповідь.

Відповіді:

1. a) $c = \sqrt{1,96}$; б) $c = \sqrt{2,25}$. 2. a) А; б) А. 3. а) Б;

б) Б. 4. а) Б; б) Б. 5. а) В; б) Б. 6. а) В; б) Б. 48. а) А; б) В.

Підвищений рівень містить задачі, де необхідно виконати 4—6 логічних кроків, розв'язання яких вимагає від абітурієнта творчого застосування отриманих знань із достатньо повним і чітким його обґрунтуванням.

2. Завдання підвищованого рівня

49. Визначити вид числа:

a) $\sqrt{5+2\sqrt{6}} + \sqrt{5-2\sqrt{6}}$;

б) $\sqrt{5-2\sqrt{6}} - \sqrt{5+2\sqrt{6}}$.

50. а) Довести, що число

$\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-6\sqrt{20}}}}$ натуральне;

б) Довести, що число

$2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}$ ірраціональне.

52. Визначити знак виразу:

а) $\sqrt{3} - \sqrt[3]{2}$; б) $\sqrt[3]{2} - \sqrt{3}$.

Обчислити:

53. а) $(4 + \sqrt{15})(\sqrt{10} - \sqrt{6}) \cdot \sqrt{4 - \sqrt{15}}$;

б) $\sqrt{3 - \sqrt{5}} \cdot (3 + \sqrt{5})(\sqrt{10} - \sqrt{2})$.


58. а) $(0,1)^{-2} \cdot (0,9)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}^{-0,5} \cdot (0,81)^{-0,5}$;

б) $((0,6)^{-4})^{-0,25} \cdot (0,09)^{-0,5} \cdot (-3)^0 \cdot (0,1)^{-1}$.

59. а) $\left(5\sqrt{5}\right)^{-\frac{2}{3}} - 81^{-0,25} \left(5\sqrt{5}\right)^{-\frac{2}{3}} + 81^{-0,25}$;

б) $\left(16^{-0,25} - (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}}\right) \left(16^{-0,25} + (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}}\right)$.

ВСТУПНІ ІСПИТИ



Позбутися ірраціональності у знаменнику:

60. а) $\frac{14}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{2}}$; б) $\frac{4}{\sqrt[3]{13} - \sqrt[3]{9}}$.

62. а) $\frac{6}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$; б) $\frac{1}{\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}}$.

Обчислити:

63. а) $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \operatorname{arcctg} 3\right)$; б) $\sin\left(2 \arccos \frac{1}{4}\right)$.

67. а) $\frac{\sin 24^\circ \cos 6^\circ - \sin 6^\circ \sin 66^\circ}{\sin 21^\circ \cos 39^\circ - \sin 39^\circ \cos 21^\circ}$;

б) $\frac{\sin 20^\circ \cos 10^\circ + \cos 160^\circ \cos 100^\circ}{\sin 21^\circ \cos 9^\circ + \cos 159^\circ \cos 99^\circ}$.

72. а) $\arccos(\cos(2 \operatorname{arcctg}(\sqrt{2}-1)))$;

б) $\arcsin(\cos(2 \arccos(\sqrt{2}-1)))$.

Знайти значення виразу:

73. а) $\cos\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{3}{5} - 2 \operatorname{arctg}(-2)\right)$;

б) $\cos\left(\frac{1}{2} \arcsin \frac{4}{5} - 2 \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$.

74. а) $\operatorname{tg} 20^\circ \cos^{-1} 20^\circ \operatorname{tg} 40^\circ \cos^{-1} 40^\circ \operatorname{tg} 60^\circ \cos^{-1} 60^\circ$
тг 80° cos⁻¹ 80°;

б) $\sin 10^\circ \sin 20^\circ \sin 30^\circ \sin 40^\circ \sin 50^\circ \sin 60^\circ$
sin 70° sin 80°.

78. а) $-\log_2 \log_2 \sqrt[3]{\sqrt{2}}$; б) $-\log_3 \log_3 \sqrt[3]{\sqrt{3}}$.

83. а) $\log_3 7 \cdot \log_7 5 \cdot \log_5 4 + 1$;

б) $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7$.

91. а) $\log_{35} 28$, якщо $\log_{14} 7 = a$, $\log_{14} 5 = b$;

б) $\log_{275} 60$, якщо $\log_{12} 5 = a$, $\log_{12} 11 = b$.

98. Визначити знак числа:

а) $\log_{1,7}(0,5(1 - \log_7 3))$; б) $\log_{0,3}\left(\frac{10}{7}(\log_2 5 - 1)\right)$.

Відповіді. 49. а) ірраціональне; б) ірраціональне. 52. а) $\sqrt{3} - \sqrt[3]{2} > 0$; б) $\sqrt[3]{2} - \sqrt{3} < 0$. 53. а) 2, б) 8.

58. а) 40, б) 20. 59. а) $-\frac{16}{225}$; б) $-\frac{7}{4}$.

60. а) $2(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2})(3 + \sqrt{2})$;

б) $(\sqrt[3]{13} - \sqrt[3]{9})(\sqrt[3]{13} + 3)$. 62. а) $\frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{30}}{2}$;

б) $\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}$. 63. а) $\frac{1}{\sqrt{10} + 3}$; б) $\frac{\sqrt{15}}{8}$. 67. а) -1 ; б) 1.

72. а) $\frac{3\pi}{4}$; б) $-\frac{\pi}{4}$. 74. а) 48, б) $\frac{3}{256}$. 78. а) 3, б) 2. 83.

а) $\log_3 12$; б) 2. 91. а) $\frac{2-a}{a+b}$; б) $\frac{a+1}{2a+b}$.

98. а) $\log_{1,7}(0,5(1 - \log_7 3)) < 0$;

б) $\log_{0,3}\left(\frac{10}{7}(\log_2 5 - 1)\right) < 0$.

Поглиблений рівень — це, як правило, задачі та вправи, розв'язання яких вимагає вміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, застосову-

вати оригінальні та штучні прийоми, показати глибину та строгость суджень. Ці задачі призначені для тих, хто вивчає шкільний курс математики на поглиблениму рівні.

3. Завдання поглибленого рівня

Довести, що:

99. а) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - 2\sqrt{6}$ — натуральне число;

б) $\sqrt[3]{7 + \sqrt{50}} + \sqrt[3]{7 - 5\sqrt{2}}$ — натуральне число.

105. а) $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ — ірраціональне число;

б) $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ — ірраціональне число.

107. Довести рівність:

а) $(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}) = 1$;

б) $(12\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{16} - 2\sqrt[3]{2})(5\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}}) = 84$.

108. а) Довести, що числа $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ не можуть бути членами однієї арифметичної прогресії.

б) Довести, що числа $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$ не можуть бути членами однієї арифметичної прогресії.

109. Записати у вигляді дробу $r = \frac{m}{n}$, де $m \in N$, $n \in N$ — періодичний дріб:

а) 0,(45); б) 3,(173).

111. Спростити вираз:

а) $\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{10 + 6\sqrt{3}}}}$;

б) $\sqrt{5 - \sqrt{3 - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}}}$.

Порівняти числа:

114. а) $\sqrt[20]{2} + \sqrt[30]{3}$ і 2; б) $\sqrt[5]{\sqrt{11} - 3}$ і $\sqrt[10]{11} - \sqrt[5]{3}$.

117. а) $3 \log_{16} 1862 + \log_{16} 1866$ і $\log_2 1863$;

б) $\log_{1147} 1154 + 7 \log_{1147} 1146$ і 8.

Довести методом математичної індукції, що для $n \in N$:

118. а) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;

б) $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

121. а) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 2$;

б) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{2}{3}$.

Обчислити:


126. а) $\sin(2 \operatorname{arcctg} \frac{1}{2}) + \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \arcsin \frac{15}{17}\right)$;

б) $\sin(2 \operatorname{arcctg} \frac{1}{2}) - \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \arcsin \frac{15}{17}\right)$.

133. а) $\operatorname{tg} 830^\circ + \operatorname{tg} 770^\circ + \operatorname{tg} 740^\circ - \operatorname{tg} 470^\circ \cdot \operatorname{tg} 410^\circ$;
· $\operatorname{tg} 380^\circ$;

б) $\operatorname{tg} 12^\circ \cdot \operatorname{tg} 24^\circ + \operatorname{tg} 24^\circ \cdot \operatorname{tg} 54^\circ + \operatorname{tg} 54^\circ \cdot \operatorname{tg} 12^\circ$.

ВСТУПНІ ІСПИТИ



138. а) Розташувати в порядку зростання числа $a = \log_2 3$, $b = \log_6 9$, $c = \log_5 17$;

б) Розташувати в порядку зростання числа $a = \log_5 7$, $b = \log_8 3$, $c = \sqrt{2}$, $d = \log_{\frac{1}{4}} 5$.

Відповіді.

109. а) $\frac{5}{11}$; б) $\frac{1571}{495}$. 111. а) $\sqrt{3} + 1$; б) 1.

114. а) $20\sqrt{2} + 30\sqrt{3} > 2$; б) $\sqrt[5]{\sqrt{11}-3} > \sqrt[10]{11}-\sqrt[5]{3}$.

117. а) $\log_2 1863 > 3 \log_{16} 1862 + \log_{16} 1866$;

б) $8 > \log_{1147} 1154 + 7 \log_{1147} 1146$. 126. а) $\frac{7}{5}$; б) $\frac{1}{5}$.

133. а) $-\frac{119}{120}$; б) $-\frac{1}{2}$. 138. а) $\log_6 9 < \log_2 3 < \log_5 17$

б) $\log_{\frac{1}{4}} 5 < \log_8 3 < \log_5 7 < \sqrt{2}$.

Третій розділ присвячений конкурсним задачам з математики (алгебра і початки аналізу). Їх поділено на три групи за рівнем складності: мінімально необхідний, середній та підвищений.

Розділ 1. Дійсні числа. Тотожні перетворення

§ 1 Дійсні числа

1. Задачі мінімально необхідного рівня складності

1301. а) Як з'ясувати, яке з двох від'ємних раціональних чисел $-\frac{m}{n}$ і $-\frac{p}{q}$ ($m, n, p, q \in N$) більше?

б) Як з'ясувати, яке з двох додатних раціональних чисел $\frac{m}{n}$ і $\frac{p}{q}$ ($m, n, p, q \in N$) більше?

1306. Спростити вираз:

а) $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}$;

б) $\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{1+\sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}} + \frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}}$.

Знайти цілу і дробову частини числа x :

1308. а) $x = 5,2$; б) $x = -5,2$.

1309. а) $x = \sqrt{2}$; б) $x = -\sqrt{2}$.

1323. а) Знайти $\log_{70} 32$, якщо $\log_{70} 5 = a$, $\log_{70} 7 = b$;

б) знайти $\log_{30} 12$, якщо $\log_{24} 3 = a$, $\log_{24} 5 = b$.

Обчислити без використання таблиць:

1328. а) $\sin^2 10^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 70^\circ$;

б) $\sin^2 20^\circ + \sin^2 40^\circ + \sin^2 80^\circ$.

1334. Обчислити: а) $\operatorname{ctg}\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$;

б) $\operatorname{tg}\left(3 \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$.

Відповіді. 1306. а) $\sqrt{2}$; б) 1. 1308. а) $[x] = 5$, $\{x\} = 0,2$;

б) $[x] = 6$, $\{x\} = 0,8$. 1309. а) $[x] = 1$, $\{x\} = \sqrt{2} - 1$;

б) $[x] = -2$, $\{x\} = 2 - \sqrt{2}$. 1323. а) $5(1 - a - b)$;

б) $\frac{a+2}{3b+1+2a}$. 1328. а) $\frac{3}{2}$; б) $\frac{3}{2}$. 1334. а) $3 + \sqrt{10}$;

б) $\frac{11}{2}$.

2. Задачі середнього рівня складності

Обчислити найпростішим способом:

1336. а) $1,2345^4 + 0,7655^4 - 1,2345^3 \cdot 0,7655^3 - 1,2345^2 \cdot 0,7655^2 + 4,938 \cdot 3,062$;

б) $(5,5427^3 + 2,1427^3 + 2 \cdot 5,5427 \cdot 3,8427 \cdot 2,1427) : (5,5427^2 + 2,1427^2)$.

1337. а) $\frac{66666 \cdot 666666}{1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1}$;

б) $\frac{777777 \cdot 777777}{1+2+3+4+5+6+7+6+5+4+3+2+1}$.

1345. а) Чи можна представити число 1000...02 у вигляді суми кубів двох натуральних чисел?

б) Сума цифр натурального числа 1997. Чи може це натуральне число виявитися точним квадратом?

Обчислити без допомоги таблиць і калькулятора:

1358. а) $\frac{1}{\cos^2 10^\circ} + \frac{1}{\cos^2 50^\circ} + \frac{1}{\cos^2 70^\circ}$; б) $\operatorname{ctg}^2 10^\circ + \operatorname{ctg}^2 50^\circ + \operatorname{ctg}^2 70^\circ$.

1364. а) $\operatorname{arcctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arcctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arcctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arcctg} \frac{1}{8}$;

б) $\operatorname{arctg} 3 + \operatorname{arctg} 5 + \operatorname{arctg} 7 + \operatorname{arctg} 8$.

1367. Довести рівність: а) $\operatorname{tg} 830^\circ + \operatorname{tg} 770^\circ + \operatorname{tg} 740^\circ = \operatorname{tg} 470^\circ \cdot \operatorname{tg} 410^\circ \cdot \operatorname{tg} 380^\circ$;

б) $\operatorname{tg} 12^\circ \cdot \operatorname{tg} 24^\circ + \operatorname{tg} 24^\circ \cdot \operatorname{tg} 54^\circ + \operatorname{tg} 54^\circ \cdot \operatorname{tg} 12^\circ = 1$.

Відповіді.

1336. а) 16, б) 7,6854. 1337. а) 0, б) 1753086434.

1345. а) не можна, б) ні. 1358. а) 12, б) 33.

1364. а) $\frac{\pi}{4}$; б) $\frac{\pi}{4}$.

3. Задачі підвищеної складності

1371. а) Довести, що ні при якому натуральному n число $n^2 + 1$ не ділиться на 3;

б) число $3^{105} + 4^{105}$ ділиться на 13, 49, 181 і 379, але не ділиться на 5 і 11. Як це перевірити?

1376. а) Добуток п'яти послідовних натуральних чисел у 120 разів більший за число \overline{ABABAB} .

Знайдіть названі п'ять чисел;

б) добуток трьох послідовних непарних чисел у


5 разів менший за число \overline{BABABA} . Знайдіть названі непарні числа.

§ 2. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

1. Задачі мінімально необхідного рівня складності

1383. Спростити вираз:

а) $x + 1 + \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 + 10x + 25}$;



6) $\sqrt{a^2 + 6a + 9} + \sqrt{a^2 - 6a + 9}$.

1389. а) Довести тотожну рівність

$$(1 + ab + a + b)^2 - (1 - ab + a - b)^2 = 4b(1 + a)^2;$$

б) довести рівність

$$\left(\frac{a-3}{7a-4} - \frac{a-3}{a-4}\right) \cdot \frac{7a-4}{9a-3a^2} = \frac{14-a^2}{4-a} - a - 4.$$

2. Задачі середнього рівня складності

1396. Спростити вираз:

а) $\frac{a-b}{a+b} + \frac{b-c}{b+c} + \frac{c-a}{c+a} + \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$, $b \neq c$;

б) $\frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)}$.

1400. а) Довести, що якщо $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$,

то $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^{2n+1} = \frac{1}{a^{2n+1} + b^{2n+1} + c^{2n+1}}$;

б) довести, що якщо три дійсних числа a, b, c зв'язані співвідношенням $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$, то обов'язково два з цих чисел рівні за модулем і протилежні за знаком.

3. Задачі підвищеного рівня складності

1403. а) Розкласти на множники, не групуючи члени, вираз

$$x^8 - x^7y + x^6y^2 - x^5y^3 + x^4y^4 - x^3y^5 + x^2y^6 - xy^7 + y^8;$$

б) розкласти на множники $1 + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^{2^k-1}$.

Відповіді.

1376. а) 35, 36, 37, 38, 39; б) 35, 37, 39.

1383. а) $-x - 1$, якщо $x \leq -5$; $x + 9$, якщо $-5 \leq x \leq 3$;

$3x + 3$, якщо $x > 3$; б) $-2a$, якщо $a \leq -3$; 6, якщо $-3 < a \leq 3$; $2a$, якщо $a > 3$.

1396. а) 0, б) $a + b + c$.

1403. а) $(x^2 - xy + y^2)(x^6 - x^2y^3 + y^6)$; б) $(1 + x)(1 +$

$$+ x^2)(1 + x^4)(1 + x^8) \dots \left(1 + x^{2^k-1}\right).$$

Розділ 2. Рівняння, нерівності і їх системи

§ 1. Алгебраїчні рівняння, нерівності і їх системи

1. Задачі

мінімально необхідного рівня складності

Розв'язати рівняння:

1449. а) $\frac{x}{x+1} - \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} = 0$;

б) $\frac{2}{x^2+5x} + \frac{3}{2x-10} = \frac{15}{x^2-25}$.

1472. а) $5 \sin 2x - 11(\sin x + \cos x) + 7 = 0$;

б) $\sin 2z + 5(\sin z + \cos z) + 1 = 0$.

1486. а) $(\sqrt{5\sqrt{2}-7})^x + 6(\sqrt{5\sqrt{2}+7})^x = 7$;

б) $(6 - \sqrt{35})^x + (6 + \sqrt{35})^x = 142$.

1501. а) $\log_{0,5}(x^2 - 3x) = \log_{0,5}(x + 12)$; б) $\log_4(x^2 + 3x - 4) = \log_4 \frac{x-1}{x+4}$.

Розв'язати систему рівнянь:

1510. а) $\begin{cases} 3|x| + 5y + 9 = 0, \\ 2x - |y| - 7 = 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} |x| + 3y = 7, \\ 2x + 2|y - 1| = 3. \end{cases}$

1521. а) $\begin{cases} \sqrt{x^2 + 4xy - 3y^2} = x + 1, \\ x - y = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} \sqrt{2x^2 + xy + 3y^2} = y + 4, \\ x + y = 5. \end{cases}$

1545. а) $\begin{cases} \log_4 x - \log_2 y = 0, \\ x^2 + 2y^2 - 8 = 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} \log_2 x + \log_4 y = 2, \\ x^2 - 3y^2 + 44 = 0. \end{cases}$

Розв'язати нерівність:

1555. а) $\frac{2}{x+2} + \frac{2}{3x-1} \geq \frac{3}{2x-3}$;

б) $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} - \frac{3}{x+2} < 0$.

1565. а) $\frac{x-7}{\sqrt{4x^2-19x+12}} < 0$;

б) $\frac{\sqrt{17-15x-2x^2}}{x+3} > 0$.

Розв'язати систему нерівностей:

1607. а) $\begin{cases} (x^2 - 4x)(x-1) \leq 0, \\ (x^2 - 1)(3-x) \geq 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} (x^2 - 4)(x^2 - 2x + 1) \geq 0 \\ (x-14)(7-x^2) \leq 0. \end{cases}$

1629. а) $\begin{cases} 2\sin(30^\circ - 3x) \leq 1, \\ 2\cos(30^\circ - 3x) \leq -\sqrt{3}; \end{cases}$


б) $\begin{cases} 2\sin(45^\circ - 3x) \leq \sqrt{2}, \\ 2\cos(45^\circ - 3x) \leq -\sqrt{2}. \end{cases}$

Відповіді.

1449. а) 3; б) $-\frac{4}{3}$.

1472. а) $(-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{2} \arcsin \frac{24}{25} + \frac{\pi}{2} k$, $k \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. **1486.** а) $\log_{\sqrt{5\sqrt{2}-7}} 6$; б) -2 ; 2.



ВСТУПНІ ІСПИТИ

- 1501.** а) $-2; 6$; б) -5 . **1510.** а) $\left\{\frac{44}{7}; -\frac{39}{7}\right\}$; б) $\{0,25; 2,25\}$. **1521.** а) $\{2; 1\}$; б) $\{3; 2\}$. **1545.** а) $\{4; 2\}$; б) $\{2; 4\}$.
1555. а) $(-2; 0] \cup \left(\frac{1}{3}; \frac{3}{2}\right) \cup [5; +\infty)$; б) $(-\infty; 1) \cup (2; 3) \cup (5; +\infty)$. **1565.** а) $(-\infty; \frac{3}{4}] \cup (4; 7)$; б) $(-3; 1)$.
1607. а) $(-\infty; -1) \cup [1; 3]$; б) $[-\sqrt{7}; -2] \cup \{1\} \cup [\sqrt{2}; \sqrt{7}] \cup [4; +\infty)$. **1629.** а) $[60^\circ + 120^\circ n; 80^\circ + 120^\circ n], n \in \mathbb{Z}$; б) $[120^\circ n; 60^\circ + 120^\circ n], n \in \mathbb{Z}$.

У навчальному посібнику для розв'язування подано 2084 задачі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевз Г. Методи навчання математики. / Математика в школі. — № 4. — 1998. — С. 4—5.
 2. Мурanova Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К., Мазур О. К. Алгебра. Збірник тестових задач для вступників до вищих навчальних закладів: Навч. посібник. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2009. — 288 с.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Інна БОГОМОЛОВА

Досвід організації навчання статистики в польських школах*

Імовірність і відносна частота

Як уже зазначалося раніше, у підручнику [10] є параграф, присвячений імовірності. Тут статистичні ідеї сприяють формуванню поняття ймовірності. У цьому параграфі перший пункт присвячено ігровим автоматам. Автори розглядають два способи оцінювання або підрахунку ймовірності виграшу: перший — статистичний, на основі інформації, зібраної за результатами гри; другий — теоретичний, на підставі класичного означення ймовірності. Розглянемо сутність кожного з них на прикладі.

Перший спосіб. 1000 разів закидають монету до грального автомата і при цьому 141 раз виграють. Імовірність отримати якийсь виграш у даній грі можна вважати такою, що наблизено дорівнює

$$\frac{141}{1000} = 0,141, \text{ в той час, як програшу} — 1 - 0,141 = 0,859.$$

Другий спосіб. Нехай ми знаємо устрій автомата: автомат має три барабани, на кожному з яких 20 секцій з позначками (таблиця 5).

Таблиця 5

Позначка Барабан	Кількість випадань позначок на барабані						
	★	●	■■■	◆◆	○	△	○○
1-й	1	4	5	3	6	1	0
2-й	1	1	3	5	1	9	0
3-й	1	3	0	0	5	1	10

Усі позначки на довільному барабані з'являються незалежно від їх появи на інших барабанах. Обчислимо кількість появожної виграшної комбінації. З таблиці можна побачити, що на першому барабані позначка ● випадає 4 рази. Для кожної її появи позначка ★ на другому барабані з'являється 1 раз. Тому на перших двох барабанах комбінація позначок ●★ з'являється $4 \cdot 1 = 4$ рази, а на всіх трьох барабанах комбінація

●★☆铃 — $4 \cdot 1 \cdot 1 = 4$ рази (саме у такому порядку). Оскільки на кожному барабані по 20 секцій, то разом може з'явитися $20 \cdot 20 \cdot 20 = 8000$ різноманітних комбінацій. У таблиці 6 у третьому стовпчику наведено кількість разів появиожної з виграшних комбінацій, у четвертому — ймовірність появиожної з них. Вважаємо, що барабан обертається з великою швидкістю і кожна секція може з'явитися з тією самою ймовірністю.

Будь-яка виграшна комбінація з'являється 900 + 300 + 6 + 30 + 4 + 12 + 9 + 9 + 15 + 1 = 1286 разів, тому ймовірність виграшу дорівнює 0,161, відповідно, ймовірність програшу — 0,839. Як ба-

чимо, результати, отримані на підставі класичного означення ймовірності, добре узгоджуються зі статистичними оцінками ймовірностей (5-й стовпчик останньої таблиці): 0,141 і 0,59 відповідно.

Емпіричні та теоретичні дані практично збігаються. До речі, отримані дані вказують на низьку ймовірність виграшу, що допомагає школяру усвідомити, на який ризик він іде, граючи в автомати.

* Закінчення. Початок див.: Матем. в шк. — 2010. — № 6